



## ¿Qué es la celulitis?

La celulitis es una infección que puede afectar la piel y/o los ojos.

Hay dos tipos de celulitis que afectan los ojos:

- periorbitaria
- orbitaria

La celulitis periorbitaria solo afecta el tejido de los párpados. Este tipo de celulitis suele aparecer en niños, en especial, niños pequeños.

La celulitis orbitaria afecta la cuenca del ojo (llamada órbita). Esta forma de celulitis puede hacer que el ojo o el párpado se hinchen, lo cual impide que el ojo se mueva correctamente.


La celulitis orbitaria es una afección grave. A menudo se debe tratar más agresivamente que la celulitis periorbitaria.

## ¿Qué causa la celulitis?

La celulitis suele ser causada por una infección por bacterias. También puede ser causada por una infección micótica.

Otros problemas que pueden llevar al desarrollo de celulitis son:

- mordeduras de insectos
- herida en la piel (en especial en la cara)
- cirugía dental u otra cirugía en la cabeza y el cuello
- infección sinusal
- asma



Examen ocular

Una infección puede comenzar en los senos paranasales y luego extenderse a la órbita o el párpado. Debido a que las infecciones sinusales son más habituales cuando hace frío, la celulitis es más frecuente en invierno.

Es importante limpiar cualquier herida cuidadosamente. También debe seguir las instrucciones de su médico o dentista para los cuidados después de una cirugía.

La celulitis es grave porque la infección se esparce rápidamente. Por eso debe tratarse de inmediato.

Si piensa que usted o su hijo tiene celulitis, llame al médico inmediatamente. Si no se trata

de inmediato, la celulitis puede causar pérdida de la visión o, incluso, esparcirse por todo el cuerpo.

## ¿Cuáles son los síntomas de la celulitis?

Estos son algunos de los síntomas de la celulitis:

- protrusión ocular
- hinchazón del párpado o del tejido que rodea el ojo
- párpados rojos
- problemas para mover el ojo
- visión borrosa o visión doble
- fiebre
- sensación de que no tiene mucha energía
- problemas para ver bien

## ¿Cómo se diagnostica la celulitis?

Para determinar si tiene celulitis, el médico le preguntará si hace poco le hicieron una cirugía o arreglo dental. También le preguntará si recientemente tuvo alguna lesión en la cara o la piel, o infección en el pecho, los pulmones o los senos paranasales.

El médico también le examinará los ojos.

Para diagnosticar el tipo de infección que tiene, el médico probablemente le hará algunas pruebas. Si el médico piensa que es posible que tenga celulitis periorbitaria, tal vez analice tejido de su nariz u ojos. Si sospecha que tiene celulitis orbitaria, tal vez le haga un análisis de sangre.

En algunos casos, el médico también puede pedir que se haga un estudio por imágenes del área afectada. Esas imágenes ayudarán al médico a ver dónde está la infección en la órbita.

Al parecer, a medida que cada vez: más gente se vacuna contra la gripe, son menos las personas que desarrollan celulitis, en especial, celulitis periorbitaria.

## ¿Cómo se trata la celulitis?

En la mayoría de los casos, el médico le dará un medicamento antibiótico para tratar la celulitis.

En la celulitis periorbitaria, debería empezar a notar que la infección mejora en aproximadamente un día o dos mientras toma los antibióticos.

Debido a que es más grave, es posible que la celulitis orbitaria no mejore con antibióticos (orales). Si eso sucede, tal vez deba permanecer en el hospital para recibir tratamiento.

Alf le darán antibióticos especiales en forma continua a través de una vena del cuerpo.

En algunos casos, es posible que el médico deba drenar líquido del área infectada. A veces, eso se puede realizar en el consultorio del médico. Otras veces, tal vez se requiera una cirugía en un hospital o clínica ambulatoria.

El médico le explicará el tratamiento de la celulitis escogido para usted. Si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. Su oftalmólogo está comprometido con la protección de su vista.

## Resumen

La celulitis es una infección que puede afectar la piel y/o los ojos. Hay dos tipos de celulitis ocular alrededor del ojo. La celulitis periorbitaria solo afecta el párpado. Este tipo de celulitis por lo general afecta a niños pequeños. La celulitis orbitaria afecta la cuenca ocular. Es una afección grave que provoca hinchazón en el ojo o el párpado, y afecta el movimiento ocular.

Algunos de los síntomas de celulitis son protrusión ocular, hinchazón ocular, problemas para mover el ojo y fiebre.

La celulitis se suele tratar con medicamentos antibióticos. Es posible que la celulitis orbitaria no mejore tan rápidamente. Si eso sucede, tal vez necesite tratamiento con antibióticos en el hospital.

Infórmese más sobre la salud ocular en OjosSanos-una publicación de la Academia Americana de Oftalmología- en [aao.org/salud-ocular](http://aao.org/salud-ocular) .

**CORTESIA DE:**

